

## تأثیر بسته‌بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی‌های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن

آزاده رشیدی مهر<sup>۱\*</sup>، علی فضل آرا<sup>۲</sup>، مهدی زارعی<sup>۳</sup>، مهدی پورمهدی<sup>۴</sup>، محمد نوشاد<sup>۵</sup>

تاریخ دریافت مقاله: آذرماه ۱۳۹۷

تاریخ پذیرش مقاله: اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

### چکیده

با توجه به افزایش مصرف غذاهای آماده مانند برگر و محبوبیت آن‌ها در بین عموم، هدف از پژوهش حاضر جایگزین کردن سوریمی در فرمول برگر و بهینه‌سازی فرمول برگر با درصدهای مختلف سوریمی و همچنین ارزیابی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده روی ماندگاری برگرهای بهینه شده است. در ابتدا ژل سوریمی تولید شد و برگرها با ۲ متغیر سوریمی و گوشت چرخ شده مرغ با ارائه چندین فرمول توسط روش سطح پاسخ یا (RSM)، تولید و توسط ارزیاب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. با آنالیز نتایج حاصل از ارزیابی حسی به کمک روش سطح پاسخ، بهترین فرمول ۶۳ درصد سوریمی + ۳۷ درصد گوشت مرغ به دست آمد. سپس تغییرات کیفی برگر با فرمول برگزیده، در مدت زمان نگهداری ۲۷ روز در دمای ۲ درجه سانتی‌گراد مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از اتمسفر اصلاح شده اثر خوبی برای افزایش زمان نگهداری برگرهای تازه با فرمول جدید دارد. بنابراین در حضور اتمسفر اصلاح شده برگرها را تا ۱۲ روز می‌توان نگهداری کرد.

### ۱- مقدمه

امروزه مصرف کنندگان غذا متقاضی محصولات سالم با میزان چربی، کلسترول و کالری پایین هستند، از طرفی بنا به دلایل خاصی تولید برگر ماهی با استقبال قابل توجهی از سوی بازار و مصرف کننده رویه‌رو نشده است [۱]. همواره در طول تاریخ نگرش انسان به ماهی و سایر غذاهای دریایی در حال تغییر و تکامل بوده است، به طوری که در اوایل دهه ۷۰ میلادی، ماهی را تنها به عنوان منبعی برای مقابله با گرسنگی می‌دانستند، اما در حال حاضر، ماهی از اهمیت خاصی به عنوان غذای سالم برخوردار است [۲].<sup>۸</sup> سوریمی یک واژه ژاپنی، برای پروتئین‌های میوفیبریلی<sup>۸</sup> تغليظ شده و مرطوب عضله ماهی می‌باشد که می‌تواند

برگر، اتمسفر اصلاح شده<sup>۶</sup> (MAP)، سوریمی<sup>۷</sup>

- ۱- دانشجوی دکترای، بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپرشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز (azadehrm68@gmail.com)
- ۲- استاد، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپرشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز (a.fazlara@scu.ac.ir)
- ۳- استاد، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپرشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز (zarei@scu.ac.ir).
- ۴- دانشیار، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپرشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز (Pourmahdim@gmail.com).
- ۵- استادیار، گروه صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی (mo.noshad@gmail.com).

6- Modified Atmosphere Packaging (MAP)

7- Surimi

8- Myofibrils

در این تحقیق، ماهی کپور نقره‌ای<sup>۳</sup> تازه (از مراکز عرضه این ماهی به صورت زنده) خریداری و تا انتقال به آزمایشگاه در طول مدت زمان ۳۰ دقیقه به نسبت ۱:۱ داخل یخ قرار داده شد. پس از خالی کردن امعاواحشا و سرزني، ماهي‌ها فيله شده و پس از شستشوی فيله‌ها با آب سرد با کمک دستگاه چرخ‌گوشت مجھر به ديسك با قطر منفذ ۴ ميلی‌متر چرخ شدند.

به‌منظور تولید ژل سوريمى، گوشت چرخ شده با نسبت ۱ به ۳ گوشت به آب ( وزني / وزني ) شسته شد: شستن با آب شرب سرد ۴ درجه سانتي‌گراد صورت گرفت و به‌طور مداوم به مدت ۱۰ دقیقه در يك اتاق سرد هم زده شد. ماهى چرخ شده شسته، از طریق چهار لایه از پارچه پنیر فیلتر شد و سپس تحت‌فشار، آبگیری شد. شستشو، دو بار انجام شد. گام سوم شستشو با استفاده از محلول ۵/۰ درصد NaCl (مرک، آلمان) با نسبت ماهى چرخ شده به محلول آبی NaCl با نسبت ۱ به ۳ ماهى به محلول نمک ( وزني / وزني ) انجام شد. سپس آبگیری شد و کرایوپروتکتانت [سوکورز<sup>۴</sup> ۳ درصد(مرک، ایران) و سوربيتول<sup>۵</sup> ۳ درصد(مرک، ایران)] اضافه و به مدت ۶۰ ثانية در همزن مخلوط شدند و درنهایت در کيسه‌های پلاستيکي پلي‌اتيليني بسته‌بندی شده و در دماي -۱۸ - درجه سانتي‌گراد نگهداري شدند [۶، ۷].

## ۲-۲- تهيه برگرهای تلفيقی و تيمارسازی

پس از انجام‌دادنی نسيي گوشت چرخ شده مرغ و سوريمى آن‌ها را در داخل دستگاه مخلوط‌تكن يا آسياب برقي (گاسونيك، تركيه) به مدت يك دقیقه مخلوط و در ادامه مواد موردياز برای تهيه برگر مانند پياز، سويا،

توسط ماهي‌های دريابي و ماهي‌های آب شيرين توليد شود. سوريمى توسط استخوان‌گيري و شستن ماهي چرخ شده و توسط تثبيت کردن با کرایوپروتکتانت<sup>۱</sup> تهيه مى‌شود. تركيبات محلول در آب، چربى، خون، آنزيم، پروتئين‌های سارکوپلاسميك<sup>۲</sup> و مواد مولد بو و تركيبات ايجاد‌کننده طعم، طي عمليات خاص شستشوی ماهي از آن جدا مى‌شوند [۳]. سوريمى يك جزء مهم برای توليد مواد غذائي انتخاب شده در بسياري از كشورها است، زيرا سوريمى باعث بهبود بازده، تركيب آسان تثبيت‌کننده‌ها، انعطاف‌پذيری در آماده‌سازی مواد غذائي و مناسب بودن تركيب مى‌شود [۴]. سوريمى عموماً مستقيم مصرف نمى‌شود و از آن برای تهيه فرآورده‌های ديگر استفاده مى‌گردد [۵].

با توجه به افزايش مصرف غذاهاي آماده مانند برگر و محبوبيت آن‌ها در بين عموم، هدف از پژوهش حاضر، جايگزين کردن سوريمى در فرمول برگر و بهينه‌سازی فرمول برگر با درصد‌های مختلف سوريمى است که باعث افزايش سرانه مصرف ماهي شود. از طرف ديگر، افزايش مدت زمان ماندگاري برگر با استفاده از روش بسته‌بندی MAP مى‌باشد. از طرفی ديگر بررسی افزایش ماندگاری محصول حاصل در بسته‌بندی‌های عمومی و MAP در تركيب گازی اکسیژن ۰٪، دی‌اکسید کربن ۶۵٪ و گاز نيتروژن ۳۵٪ صورت گرفت.

## ۲- مواد و روش‌ها

### ۲-۱- تهيه گوشت چرخ شده مرغ و ژل سوريمى ماهي

گوشت مرغ تازه به تاريخ توليد روز از بازار تهيه و پس از استخوان‌گيري كامل و شستشو توسط دستگاه چرخ‌گوشت(جهان آوا، ايران) با منافذی به قطر ۴ ميلی‌متر چرخ شد و در کيسه‌های پلاستيکي پلي‌اتيليني در دماي -۱۸ درجه سانتي‌گراد نگهداري شد [۶].

3- Hypophthalmichthys Molitrix

4- Sucrose

5- Sorbitol

فصلنامه علمي-Technique و فنون

بسته‌بندی

1- Cryoprotectants  
2- Sarcoplasmic

<p><b>۲-۴- آنالیزهای میکروبیولوژیکی</b></p> <p>برای آنالیزهای میکروبی، ۱۰ گرم از نمونه برگر با ۹۰ میلی لیتر آب مقطر استریل در استومیکر<sup>۳</sup> (ایترساینس<sup>۴</sup>، فرانسه) به مدت ۳ دقیقه همگن و رقت‌سازی انجام شد. شمارش کلی مزووفیل‌ها با استفاده از محیط کشت [۹] (مرک، آلمان)<sup>۵</sup> PCA انجام و به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرمخانه‌گذاری شد. برای شمارش کلی سرمادوست‌ها [۹] نیز با استفاده از محیط کشت PCA و به مدت ۱۰ روز در دمای ۷ درجه سانتی‌گراد گرمخانه‌گذاری شد. برای شمارش باکتری‌های اسید لاكتیک [۱۰] از محیط کشت<sup>۶</sup> MRS (Q Lab، کانادا) استفاده شد و به مدت ۳ روز در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد گرمخانه‌گذاری شد. از محیط کشت (مرک، آلمان)<sup>۷</sup> SPS نیز برای جستجوی کلستریدیای<sup>۸</sup> احیاکننده سولفیت [۱۱] استفاده شد که به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد گرمخانه‌گذاری شد. برای شمارش کپک و مخمر [۱۲] از محیط کشت کپک و مخمر<sup>۹</sup> (مرک، آلمان) استفاده شد و به مدت ۵ روز در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد گرمخانه‌گذاری شدند.</p> <p><b>۲-۵- آنالیزهای شیمیایی</b></p> <p>تعیین pH با استفاده از دستگاه pH متر (سارتوریوس<sup>۱۰</sup>، آمریکا) انجام شد<sup>[۱۲]</sup>. اندازه‌گیری ازت آزاد فرار<sup>۱۱</sup> (TVN) بر طبق روش ماله<sup>۱۲</sup> و پومیرول<sup>۱۳</sup></p> <hr/> <p>3- Stomacher 4- Interscience 5- Plate Count Agar 6- de Man Rogosa Sharpe Agar 7- Sulfite-Polymyxin-Sulfadiazine Agar 8- Clostridia 9- Yeast Extract Agar 10- Sartorius 11- Total Volatile Base Nitrogen 12- Malle 13- Poumeyrol</p>	<p>ادویه‌ها (فلفل سیاه و پودر سیر)، نمک و نیسین<sup>۱</sup> (سیگما آلدربیج، انگلستان) اضافه و مجدد عمل آسیاب کردن به مدت دو دقیقه دیگر ادامه یافت. جهت فرمدهی از یک همبرگرساز معمولی، برگرهایی به ابعاد، قطر ۵ سانتی‌متر و ضخامت ۱ سانتی‌متر تولید شد. قطعه‌های برگرهای درون کیسه‌های پلاستیکی پلی‌اتیلنی در قطعات ۶ عددی بسته‌بندی و نشانه‌گذاری شدند. محصول تولید شده تا زمان انجام آزمایش‌ها در برودت ۲ درجه سانتی‌گراد نگهداری گردید<sup>[۶]</sup>.</p> <p>فرمول برگزیده برگرهای بر طبق نتایج آزمون‌های حسی و روش سطح پاسخ یا<sup>۲</sup> RSM به دست آمد سپس برگر با فرمول بهینه‌شده به گروه‌های، بسته‌بندی معمولی و MAP تقسیم شدند. برگرهای برای انجام آزمایش‌ها در شرایط سردخانه‌ای (برودت ۲ درجه سانتی‌گراد) نگهداری شدند. نمونه‌برداری برای تعیین شاخص‌های میکروبی و شیمیایی در روزهای ۰، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ انجام گردید. نمونه‌برداری به صورت کاملاً تصادفی و آزمایش‌ها با ۳ بار تکرار انجام شدند.</p> <p><b>۲-۳- ارزیابی حسی</b></p> <p>پانل شامل هفت ارزیاب باتجربه (در آزمایشگاه آموزش‌دهنده) برای ارزیابی حسی بود. همه ارزیاب‌ها قبل از جلسات آموزشی شرکت کرده بودند تا با ویژگی‌های حسی برگر پخته‌شده آشنا شوند. از اعضای پانل خواسته شد که رنگ، طعم، بو و کیفیت کلی را ارزیابی کنند. از مقیاس ۹ نقطه‌ای برای هر ویژگی استفاده شد که امتیاز ۹ برابر یا کیفیت بسیار خوب، امتیازهای ۸-۷ کیفیت خوب و امتیاز ۶ قابل قبول می‌باشند. ارزش‌های برابر با امتیاز یا عدد ۵ حد آستانه پذیرش هستند و امتیازهای ۴-۱ غیرقابل پذیرش در نظر گرفته شدند<sup>[۸]</sup>.</p> <hr/> <p>1- Nisin 2- Response Surface Methodology</p>
---	---

سوریمی و ۳۷ درصد گوشت چرخ شده مرغ بود و تمامی آزمایش‌های میکروبی، شیمیایی و ویژگی‌های پخت روی فرمول برگر برگزیده انجام شد.

### ۲-۳- آنالیزهای میکروبی

بر طبق (شکل ۱) میزان شمارش کلی مزو菲尔 برگرها در تمامی روزهای نگهداری تحت شرایط بسته‌بندی مختلف، روند افزایشی داشت و تفاوت معنی‌داری بود  $p < 0.001$ . حداکثر شمارش قابل پذیرش باکتری‌های مزو菲尔  $10^7 \text{ log cfu/g}$  در ماهی تازه و منجمد است. شمارش اولیه باکتری‌های مزو菲尔 تقریباً  $4/05$  (معمولی)، شمارش به سطح  $\log \text{cfu/g}$  (MAP)  $4/38$  بود که در پایان روز نگهداری به ترتیب به سطح  $8/78$  و  $6/18 \text{ log cfu/g}$  رسیدند. در این مطالعه تعداد باکتری‌های شمارش کلی مزو菲尔ها در بسته‌بندی معمولی در روز نهم نگهداری از حد استاندارد  $\sqrt{\log \text{cfu/g}}$  بالاتر رفت. بنابراین شرایط متفاوت

(۱۹۸۹) با استفاده از دستگاه کلدال<sup>۱</sup> (بخشی ایران) اندازه‌گیری گردید [۱۴]. تیوباربیتوریک اسید<sup>۲</sup> (TBA) بر حسب میزان مالون دی آلدئید در هر کیلوگرم از برگر اندازه‌گیری شد. کدورت‌سنجه با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومر<sup>۳</sup> (سیسیل<sup>۴</sup>، انگلستان) و بر طبق روش ماله و پومیرول (۱۹۸۹) انجام شد [۱۴].


### ۶-۲- تجزیه تحلیل آماری

داده‌های بدست‌آمده با کمک نرم‌افزار<sup>۵</sup> SPSS به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و بدین منظور تحلیل داده‌ها با آنالیز واریانس<sup>۶</sup> (ANOVA) و نیز<sup>۷</sup> انجام شد.  $a = 0/05$  مبنای قضاوت آماری لحظه گردید.

### ۳- نتایج و بحث

#### ۱- بهینه‌سازی برگر تلفیقی

با استفاده از روش سطح پاسخ بر پایه نتایج ارزیابی حسی، فرمول برگر برگزیده انتخاب شد که شامل ۶۳ درصد




شکل ۱- شمارش باکتری‌های مزو菲尔 ( $\log \text{cfu/g}$ ) در تیمارهای مختلف در طول نگهداری در دمای ۲ درجه سانتی‌گراد

Aثر مهاری روی باکتری‌های مزو菲尔 نمونه‌های برگر داشت. همچنین موهلیسین<sup>۸</sup> و همکاران (۲۰۱۳) نشان دادند که با اضافه کردن ۳۰ درصد دی‌اکسید کربن به

#### 8- Muhlisin

فناوری علمی و فنون  
بسته‌بندی

- 1- Kildale
- 2- Thiobarbituric Acid
- 3- Spectrophotometer
- 4- Ceceil
- 5- Statistical Package for Social Science
- 6- Analysis of Variance
- 7- Repeated Measures Two Way Analysis of Variance



شکل ۲- شمارش باکتری‌های سرمادوست‌ها ( $\log \text{cfu/g}$ ) در تیمارهای مختلف در طول نگهداری در دمای ۲ درجه سانتی‌گراد


تهیه شده از ماهی روهو<sup>۳</sup> که به مدت ۱۱ روز در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شده بودند، شمارش کلی مزوفیل به تأخیر می‌افتد [۱۵].

در جه سانچه از ماهی روهو<sup>۳</sup> که به مدت ۱۱ روز در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شده بودند، شمارش کلی مزوفیلها و شمارش کلی سرمادوست‌ها از شمارش اولیه نمونه به میزان  $5/۶۸ \times 10^5 \text{ cfu/g}$  به  $5/۷۲ \times 10^5 \text{ cfu/g}$  و از  $1/۲۴ \times 10^5 \text{ cfu/g}$  به  $1/۲۴ \times 10^5 \text{ cfu/g}$  افزایش یافت [۱۶].

تغییرات مقادیر اسید لاکتیک باکتری‌ها و مقایسه آن‌ها در بین تیمارها در طی زمان نگهداری در (شکل ۳) آورده همکاران (۲۰۱۵) روی فیش فینگرهای پیش حرارت دیده

MAP پاته‌های همبرگر پیش حرارت دیده، رشد باکتری‌های مزوفیل به تأخیر می‌افتد [۱۵].

بر طبق (شکل ۲) مقدار شمارش کلی سرمادوست‌ها در طول زمان تغییر کرده است  $P < 0.001$  (P) شمارش اولیه باکتری‌های سرمادوست،  $4/۴۱$  و  $4/۶۲$  (معمولی)،  $4/۴۸$  و  $4/۶۲$  (MAP) بود که در پایان روز نگهداری به ترتیب به سطح  $8/۷۹$  و  $7/۰۲$   $\log \text{cfu/g}$  رسیدند. در مطالعه پرانیتا<sup>۱</sup> و همکاران (۲۰۱۵) روی فیش فینگرهای پیش حرارت دیده




شکل ۳- شمارش باکتری‌های اسید لاکتیک ( $\log \text{cfu/g}$ ) در تیمارهای مختلف در طول نگهداری در دمای ۲ درجه سانتی‌گراد

جستجوی کلستریدیای احیاکننده سولفیت در تمامی روزهای نگهداری صفر بود. در مطالعه سیلانی<sup>۴</sup> و همکاران (۲۰۱۶) جستجوی کلستریدیای احیاکننده سولفیت کمتر از  $10 \text{ cfu/g}$  بوده است[۱۱]. در مطالعه ما کلستریدیوم احیاکننده سولفیت جدا نشد.

مقادیر کپک و مخمر در طول زمان تغییر کرد (p <0.001) (شکل ۴). در این مطالعه تعداد کپک و مخمر در بسته‌بندی معمولی از روز نهم از حد استاندارد ( $\log 3 \text{ cfu/g}$ ) بالاتر رفته بود، اما در بسته‌بندی MAP فقط در روز ۱۲ نگهداری از حد مجاز بالاتر رفته است. در مطالعه کیلینس<sup>۵</sup> (۲۰۰۷) وی پاته آنسوی در دوره نگهداری ۵

شده است. شمارش اسید لاکتیک باکتری‌ها در طول زمان تغییر کرده است ( $p <0.001$ ) که جمعیت ابتدایی اسید لاکتیک باکتری‌ها تقریباً  $3 \log \text{ cfu/g}$  بود که در پایان نگهداری به  $7/5 \log \text{ cfu/g}$  و  $7/98 \log \text{ cfu/g}$  به ترتیب برای بسته‌بندی معمولی و MAP رسید. در پژوهش بابجیا<sup>۱</sup> و همکاران (۲۰۰۰) شمارش اسید لاکتیک باکتری‌ها در گوشت چرخ شده بز در طی مدت ۲۸ روز نگهداری در دمای یخچال کمتر از  $4/5 \log \text{ cfu/g}$  بود [۱۷]. روی کاهش جمعیت لاکتیک اسید باکتری‌ها تأثیر داشته است که نتایج ما با نتایج پاتسیاس<sup>۲</sup> و همکاران (۲۰۰۶) مشابه است. پاتسیاس و همکاران (۲۰۰۶) نشان دادند که جمعیت اسید لاکتیک باکتری‌ها در حدود  $1/7 \log \text{ cfu/g}$  تحت شرایط MAP در



شکل ۴- شمارش کپک و مخمر ( $\log \text{ cfu/g}$ ) در تیمارهای مختلف در طول نگهداری در دمای ۲ درجه سانتی گراد

روزه در دمای یخچال، شمارش کپک و مخمر از روز صفر تا ۵ روز کمتر از  $10 \text{ cfu/g}$  بود[۲۰]. نتایج ما با یافته‌های پاتسیاس و همکاران (۲۰۰۸) مطابقت دارد به گونه‌ای که این محققین دریافتند در شرایط MAP شمارش کپک و مخمر تا روز ۱۵ نگهداری در رنج  $3 \log 2/6$  و  $\log 3/6 \text{ cfu/g}$  می‌ماند، اما در شرایط معمولی به‌طور افزایشی رشد می‌کنند [۱۸].


مقایسه با بسته‌بندی معمولی نمونه‌های مرغ پیش حرارت دیده کاهش می‌یابد [۱۸]. اسکاندامیس و نیچاس<sup>۳</sup> (۲۰۰۲) همچنین رشد سریع اسید لاکتیک باکتری‌ها در گوشت گاو را تحت شرایط MAP در دمای ۵ درجه سانتی گراد در مقایسه با شرایط معمولی بسته‌بندی گزارش کردند[۱۹].

4- Selani  
5- Kilinc

فصلنامه علوم و فنون

**بسته‌بندی**

1- Babjia  
2- Patsias  
3- Skandamis and Nychas




شکل ۵- تغییرات pH در تیمارهای مختلف در طول نگهداری در دمای ۲ درجه سانتی‌گراد


به عنوان کرایوپروتکتانت به کار رفته است، باشد. ازت آزاد فرار به عنوان شاخصی از کیفیت ماهی تازه است، زیرا افزایش آن مربوط به فساد باکتریایی می‌باشد. غلظت<sup>۲</sup> TVN در ماهی‌های تازه گرفته شده به طور معمول بین ۵ تا ۲۰ میلی‌گرم N در ۱۰۰ گرم گزارش شده است، در حالی که سطوح ۳۰-۳۵ میلی‌گرم N در ۱۰۰ گرم گوشت به طور کلی به عنوان حد پذیرش ماهی سرد ذخیره شده است [۲]. در تحقیق حاضر TVN در طول زمان تغییر کرده است ( $p < 0.001$ ). همچنین TVN در طی نگهداری روند افزایشی داشته است. به طوری که روز CO<sub>2</sub> باشد همچنین می‌تواند به خاطر قند موجود در برگر که

### ۳-۳- نتایج آنالیزهای شیمیایی

مطابق با (شکل ۵) pH در طی نگهداری تغییر معنی‌داری داشته است ( $p < 0.001$ ). pH در طی نگهداری کاهش یافته است. روند pH در طی نگهداری، روند کاهشی داشته است. بالاترین میزان pH در روز صفر و کمترین pH در روز ۲۷ مشاهده گردید. در مطالعه پرانیتا<sup>۱</sup> و همکاران (۲۰۱۵) pH فیش فینگر به طور معنی‌داری از ۶/۹۵ به ۶/۴۴ کاهش یافت [۱۶]. این کاهش می‌تواند به خاطر کاهش محتوای اکسیژن توسط رشد میکروفلور معمولی و آزاد شدن CO<sub>2</sub> باشد همچنین می‌تواند به خاطر قند موجود در برگر که



شکل ۶- تغییرات TVN (گوشت TVN mg/100g) در تیمارهای مختلف در طول نگهداری در دمای ۲ درجه سانتی‌گراد



شکل ۷- تغییرات TBA (گوشت MA/kg) در تیمارهای مختلف در طول نگهداری در دمای ۲ درجه

ارزش اسید تیوبارتیوریک<sup>۲</sup>، برای اندازه‌گیری اکسیداسیون لیپید در محصول به کار می‌رود و حد مجاز مصرف آن بین ۷ تا ۸ میلی‌گرم مالون آلدئید<sup>۳</sup> به ازای هر کیلوگرم می‌باشد که مقدارهای بالاتر از آن مشخص‌کننده از دست دادن کیفیت محصول است [۲۲]. بر طبق (شکل ۷) TBA در طول زمان تغییر کرده است ( $p < 0.001$ ). در مطالعه حاضر TBA در طی نگهداری افزایش یافته است، اما حد استاندارد آن را که ۷-۸ میلی‌گرم مالون آلدئید است، خارج نشده است. در مطالعه وانیتا<sup>۴</sup> و همکاران (۲۰۱۳)<sup>۵</sup> TBA در پایان دوره نگهداری ۹۰ روزه از ۰/۴۷ به ۰/۸ و از ۰/۲۹ به ۰/۶۷ میلی‌گرم مالون آلدئید در کیلوگرم از نمونه کلت ماهی و برگر ماهی افزایش یافت [۲۱]. در مطالعه دیگری سطوح TBA برای سوریمی تا ۱۵ روز نگهداری قابل قبول بود در حالی که غلظت TVN به ۳۸/۲ میلی‌گرم در ۱۰۰ گرم گوشت بعد از ۱۳ روز نگهداری رسید که بیشتر از حد پذیرش است [۲].

#### ۴- نتیجه گیری

برای انتخاب فرمول برگزیده، نتایج حاصل از ارزیابی حسی با استفاده از روش سطح پاسخ آنالیز شدند که بهترین فرمول ۶۷ درصد سوریمی + ۳۷ درصد گوشت

۷/۲۳ (معمولی) و ۷/۵۵ (MAP) میلی‌گرم N بر ۱۰۰ گرم بود که در پایان روز نگهداری به ترتیب به سطح ۲۷/۰۵ و ۲۰/۱۹ میلی‌گرم N بر ۱۰۰ گرم رسیدند. در یک مطالعه که روی کلت ماهی انجام شده است، TVN به مدت ۹۰ روز ذخیره‌سازی از ۳/۴۸٪ میلی‌گرم به ۴/۲۵٪ میلی‌گرم رسید. در همان مطالعه، برگر ماهی، تغییرات TVN تقریباً مشابه همان الگو در کلت ماهی بود، حد اکثر مقدار ۴/۶۳٪ میلی‌گرم پس از ۹۰ روز بود. برای تمام محصولات مقدار TVN از حد قابل قبول در طی ذخیره‌سازی به صورت انجام تجاوز نکرد [۲۱]. تغییرات محتوای TVN محصولات در طی نگهداری یخ‌زده در کلت ماهی، همبرگر ماهی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در مطالعه حاضر میزان ازته فرار در طی ۲۴ روز نگهداری روند افزایشی داشت. حد مجاز آن بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۵۸۴۹ برای فیش ۲۵ میلی‌گرم در ۱۰۰ گرم برگر می‌باشد که بر اساس آن تا آخرین روز نگهداری بیشتر از حد مجاز نبوده است. نتایج مشابه‌ای توسط پتسیاس<sup>۱</sup> و همکاران (۲۰۰۸) بدست آمده است که این محققین نشان دادند فیله مرغ نگهداری شده در شرایط MAP تا روز ۱۶ نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد کمتر از ۲۰ میلی‌گرم بر ۱۰۰ گرم گوشت است [۱۸].

2- Thiobarbituric Acid

3- Malondialdehyde

4- Vanitha

5- Thiobarbituric Acid

- japonicus) meat."** International journal of food science & technology, 4: p. 1002-1010.
5. Bentis, C.A., A. Zotos, and D. Petridis, (2005). "Production of fish-protein products (surimi) from small pelagic fish (*Sardinops pilchardus*), underutilized by the industry." Journal of Food Engineering, 68: p. 303-308.
6. Gammariello, D., et al., (2014). "A multi-step optimization approach to extend burger shelf life." Basic Research Journal of Food Science and Technology, 1: p. 15-28.
7. Rawdkuen, S., et al., (2009). "Biochemical and gelling properties of tilapia surimi and protein recovered using an acid-alkaline process." Food Chemistry, 112: p. 112-119.
8. Spinelli, S., et al., (2015). "Microencapsulated propolis to enhance the antioxidant properties of fresh fish burgers." Journal of Food Process Engineering, 38: p. 527-535.
9. APHA, (2015). "Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods." 5nd ed. American Public Health Association, Washington D.C.,
10. Doulgeraki, A.I., et al., (2010). "Lactic acid bacteria population dynamics during minced beef storage under aerobic or modified atmosphere packaging conditions." Food Microbiology, 27: p. 1028-1034.
11. Selani, M.M., et al.,(2016). "Effects of pineapple byproduct and canola oil as fat
- مرغ بود سپس تغییرات کیفی برگر با فرمول برگزیده، در مدت زمان نگهداری ۲۷ روز در دمای ۲ درجه سانتی گراد مورد مطالعه قرار گرفت. آنالیزهای میکروبی نشان داد که در شرایط بسته بندی معمولی تا روز ۶ در حد قابل قبول است و استاندارد را رد نکرده است، و عوامل شیمیایی نیز تا پایان دوره نگهداری حد استاندارد را رد نکردند. نگهداری در شرایط MAP به طور قابل توجهی زمان نگهداری را افزایش داد به طوری که برگرها با بسته بندی MAP تا ۱۲ روز قابل نگهداری بودند؛ بنابراین در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تولید برگر مرغ بهینه شده با سوریمی یک گزینه مناسب برای صنعت است که محصولات خود را به صورت گوشتش تازه به بازار عرضه می کنند همچنین می توان با بسته بندی اتمسفر اصلاح شده عمر نگهداری برگر را در شرایط یخچالی افزایش داد.
- ## ۵- منابع
1. Taşkaya, L., et al., (2003 )."Quality Changes of Fish Burger from Rainbow Trout during Refrigerated Storage. E.U." Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 20: p. 147-154.
  2. Köse, S., M. Boran, and G.( 2006). "Boran, Storage properties of refrigerated whiting mince after mincing by three different methods." Food chemistry, 99(1): p. 129-135.
  3. Dey, S. and K. Dora, (2010). "Effect of sodium lactate as cryostabilizer on physicochemical attributes of croaker (*Johnius gangeticus*) muscle protein." Journal of Food Science Technology .47 :p. 432–436.
  4. Karthikeyan, M., A.O. Dileep, and B.A. Shamasundar, (2006). "Effect of water washing on the functional and rheological properties of proteins from threadfin bream (*Nemipterus*

- minced goat meat during storage under vacuum and subsequent aerobic storage." Meat science, 54(2): p. 197-202.
- 18.Patsias, A., et al., (2006). "Shelf life of a chilled precooked chicken product stored in air and under modified atmospheres: microbiological, chemical and sensory attributes." Food Microbiology, 23: p. 423-429.
- 19.Skandamis, P. and G.J.E. Nychas, (2002). "Preservation of fresh meat with active and modified atmosphere packaging conditions." International Journal of Food Microbiology, 79: p. 35-45.
- 20.Kilinc ,B., S. Cakli, and S. Tolasa, (2008). "Quality changes of sardine (*Sardina pilchardus*) patties during refrigerated storage." Journal of food quality, 31(3): p. 366-381.
- 21.Vanitha, M., et al., (2013). "Quality evaluation of value added mince based products from catla) Catla catla) during frozen storage." International Journal of Science, Environmental and Technology, 2: p. 487-501.
- 22.Çoban, Ö.E. and G.T. Keleştemur, (2016). "Qualitative improvement of catfish burger using *Zataria multiflora* Boiss.essential oil." Journal of Food Measurement and Characterization,: p. 1-8.
- replacers on physicochemical and sensory qualities of low-fat beef burger." Meat Science, 112: p69-76.
- 12.Petrou, S., et al., (2012). "Chitosan dipping or oregano oil treatments, singly or combined on modified atmosphere packaged chicken breast meat." International Journal of Food Microbiology, 156: p. 264-271.
- 13.Namir, M., H. Siliha, and M.F. Ramadan, (2015). "Fiber pectin from tomato pomace: characteristics, functional properties and application in low-fat beef burger." Journal of Food Measurement and Characterization, 9: p. 305-312.
- 14.Malle, P. and M.A. Poumeyrol, (1989). "A new chemical criterion for the quality of fish: trimethylamine/total volatile basic nitrogen (%)." Journal of Food Protection, 50: p. 419-423.
- 15.Muhlisin, S.M.K., et al., (2013). "The effect of modified atmosphere packaging and addition of rosemary extract, sodium acetate and calcium lactate mixture on the quality of pre-cooked hamburger patties during refrigerated storage." Asian-Australasian journal of animal sciences, 26: p. 134.
- 16.Praneetha, S.S., et al., (2015). "Development of fish finger from rohu (*labeo rohita*) and its quality evaluation during refrigerated storage condition." International Journal of Science, Environmental and Technology, 4: p. 1457-1468.
- 17.Babji, Y. and T.R.K. Murthy, (2000). "Effect of inoculation of mesophilic lactic acid bacteria on microbial and sensory changes of

### آدرس نویسنده

خوزستان-اهواز-گروه بهداشت مواد غذایی-  
دانشکده دامپزشکی-دانشگاه شهید چمران  
اهواز